



ORGAFORTE

Damızlık Süt İnekleri için “Döl Verimi” aktivatörüdür.

DÖL VERİMİ KAYIPLARI

Gelişen damızlık süt ineği yetiştiriciliğinin sürü işletmelerine dönüşmesine paralel tüm dünyada en yaygın “sürü problemi” olarak karşımıza, döl verimi problemleri çıkmaktadır. Damızlık inek yetiştiriciliğinde birincil ürün olan döl veriminin sürdürülebilirliği ise “Toplam sürü yönetimi”nin başarı göstergesi olup, “Yılda ortalama bir buzağı elde etmek” hedefiyle somutlaştırılmaktadır.

Toplam sürü yönetimindeki sorunların ülkemizde ve dünyada istatistiki dağılımına bakıldığında, yüksek oranda (%85) besleme hataları ve beslenme hastalıklarının ön plana çıktığı görülmektedir. İnekteki karşılığı oosit üretimiyle başlayan cinsel aktiviteler, organizmadan bağımsız yürüyen bir fonksiyon olmayıp, ineğe ait her türlü olumsuzluk, gebe kalmadan doğuma kadar olan süreci etkilemekte, yeniden gebe kalma periyodu ile doğan buzağımızın yaşama kabiliyetinide belirlemektedir.

Üreme dediğimiz bu süreçlerde, spesifik bazı besin maddelerinin ve iz elementlerinin eksikliği, yüksek süt verimi kabiliyeti ve hedefiyle de örtüşünce, karşımıza yoğun bir şekilde “döl verimi kayıpları” ile ekonomik çöküşün başladığı gerçeği çıkmaktadır. Günlük tüketilen yem maddelerinde, hayvanımızın günlük ihtiyacını karşılamayan esansiyel aminoasitler, yağ asitleri, vitaminler, mineraller, enzimler, beta karoten v.b. doğru formülasyon ve konfigürasyonda haricen verilmelidir.

ENDİKASYONLAR

- * Karaciğerde oluşmuş, kuru dönem hasarlarının giderilmesinde öncülük etmektedir.
- * Reprodüktif hormonların metabolizmasını düzenlemektedir
- * Esansiyel amino asitler ve yağ asitleri açığını kapatmaktadır.
- * Metabolik stresin azalmasını sağlayarak ovaryel aktivitelerin başlamasını sağlamaktadır.
- * Oogenezis sürecinde folliküler ve ovaryel dinamiklerin etkinliğini sürdürmektedir.
- * Hormonal balansın sağlanması ve sürdürülmesine öncülük etmektedir.
- * Ovulasyon sonrası; fertilizasyon, implantasyon, embriyonal ve fetal dönemlerin devamlılığına destek olmaktadır.





ORGAFORTE

		Teknik Özellikler	Dozajı
Çinko (%26 Zn)	865,4 mg	* Kompleks organik mineraller başta olmak üzere içeriği oluşturan maddeler, biyo yararlanımları yüksek olup, metabolizmada kritik noktalarda gerekli olan ajanlardır. * Ürün önemli bir beta karoten kaynağıdır. Sürülerde eksik kalan A,D₃E, ihtiyacının enjeksiyonla karşılanması stresini ortadan kaldırmaktadır. * Yeni tohumlanmış yada gebeliği teşhis edilmiş ineklerde kullanım dozu 1/3 e indirilmelidir. * Kullanım için açılan kapaklar iyice kapatılmalı ısı, ışık ve nem gibi risklerden korunmalıdır. * Havadar ve serin bir ortamda muhafaza edilmelidir. * İçerdiği madde çeşitliliğine bakıldığında değerli ve zengin bir ilave olduğu görülmekte olup uygulama kurallarına uyulmasında fayda görülmektedir. * Uygulamaya başlanan bir inek yada koyunda kullanım süresi 10 günün geçmemelidir. 1 hafta ara verdikten sonra aynı miktarda doz tekrarlanabilmektedir.	100 gr/İnek/gün *5-10 gün süre ile 30 gr/Koyun- Keçi/Gün *5-10 gün süre ile 10kg/Ton yem
Demir (%22 Fe)	1000 mg		
Bakır (%25 Cu)	1500 mg		
Mangan (%22 Mn)	1250 mg		
Krom (%37)	50 mg		
Magnezyum (%52,7)	4000 mg		
Beta Karoten (%10)	20,000 mg		
Vitamin A (1,000,000 IU/gr)	1000 mg		
VitaminD3 (500.000 IU/gr)	500 mg		
Vitamin E (%50)	4000 mg		
Euganol (%100)	950 mg		
Cinnamaldehyde (%100)	550 mg		
Capsicum (%100)	350 mg		
By-Pass Methionine	37,500 mg		
Bitkisel Yağ Asidi	33,750 mg		
İnaktive Brewer's Yeast	326,000 mg		



Üretici Firma : ORGAMİN VETERİNERLİK, HAYVANCILIK, TARIM, GIDA, KİMYEVİ MADDELER, İNŞAAT, TAAHHÜT SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Tel. : 0.266 721 20 30 Faks : 0.266 721 49 90 K. Sanayi Sitesi 1335. Sokak 29. Blok No:4 Bandırma / Balıkesir

www.veterinerakademi.com

www.orgamin.com.tr

